

# Dissualon® y Dissualon® Plus

## Composición:

### Dissualon®

Cada comprimido recubierto contiene:

Atorvastatina cálcica equivalente a	
Atorvastatina .....	10 mg
Ezetimibe .....	10 mg
Excipientes c.s.p. ....	1 comprimido

### Dissualon® Plus

Cada comprimido recubierto contiene:

Atorvastatina cálcica equivalente a	
Atorvastatina .....	20 mg
Ezetimibe .....	10 mg
Excipientes c.s.p. ....	1 comprimido

## Descripción:

Dissualon® es un tratamiento de la hipercolesterolemia, que combina la acción de la Atorvastatina y el Ezetimibe. La Atorvastatina bloqueando la enzima HMG-CoA Reductasa, la cual es la responsable de la síntesis de colesterol en el organismo, mientras que el Ezetimibe inhibe la absorción del colesterol a nivel del intestino. Provocando además una disminución del "colesterol malo" o C-LDL y un aumento del "colesterol bueno" o C-HDL.

## Indicaciones:

Dissualon® está indicado en la terapia adjunta a la dieta para la reducción de los valores elevados de colesterol total, C-LDL, triglicéridos (TG) y Apo B (apolipoproteína B) en pacientes con Hipercolesterolemia primaria heterocigótica familiar y no familiar e Hipercolesterolemia homocigótica familiar, conjuntamente con otros tratamientos para reducción de lípidos.

## Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a Ezetimibe, Atorvastatina o a cualquiera de los excipientes.  
Embarazo y lactancia.  
Enfermedad hepática activa o con elevaciones injustificadas de las transaminasas séricas.  
Administración concomitante de un inhibidor potente del CYP3A4 (por ejemplo itraconazole, ketoconazole, eritromicina, claritromicina, telitromicina, inhibidores de la proteasa del VIH y nefazodona).

## Precauciones:

Miopatía/Rabdomiólisis: Se han reportado algunos casos de miopatía y rabdomiólisis. Todos los pacientes que inician la terapia, ó que sea aumentada la dosis, deben ser advertidos sobre el riesgo de miopatía e indicarles que reporten rápidamente cualquier dolor, sensibilidad o debilitamiento muscular sin explicación.

En condiciones como: Ancianos, insuficiencia renal, hipotiroidismo no controlado, historia personal o familiar de desórdenes musculares hereditarios, historia previa de

toxicidad muscular con estatinas o fibratos, abuso de alcohol; el riesgo del tratamiento debe ser considerado en relación al posible beneficio, y se recomienda el monitoreo clínico.

Si ocurre debilitamiento, calambres o dolor muscular durante el tratamiento, se deben chequear los niveles de creatina quinasa.

Insuficiencia hepática: Debido al desconocimiento de los efectos del aumento a la exposición a Ezetimibe en pacientes con insuficiencia hepática de moderada a severa, su uso no está recomendado.

## Interacciones con medicamentos:

Fibratos: La seguridad y eficacia de Ezetimibe administrado con fibratos no ha sido establecida; por consiguiente, la coadministración no está recomendada.

Ciclosporina: Se debe tener precaución al iniciar Dissualon® junto con ciclosporina. Las concentraciones de ciclosporina se deben de monitorear.

Anticoagulantes: Si se agrega Dissualon® a warfarina, a otro anticoagulante cumarínico o a fludionia; el INR debe ser monitoreado.

Diltiazem: La coadministración de Atorvastatina con Diltiazem fue asociada con un aumento de las concentraciones de Atorvastatina.

Antiácidos: Puede ocurrir una disminución de las concentraciones plasmáticas de Dissualon® cuando se administran juntos.

Anticonceptivos orales: La administración de Atorvastatina con un anticonceptivo oral conteniendo noretindrona y etinilestradiol, produce un incremento en las concentraciones plasmáticas de estos últimos.

Excipientes: Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa Lapp o problemas de absorción de galactosa - glucosa, no deben tomar este medicamento.

**Reacciones Adversas:** Dissualon® es generalmente bien tolerado. Las reacciones adversas que se han reportado han sido moderadas y pasajeras. Ocasionalmente las reacciones adversas incluyen: Dolor abdominal, astenia, constipación, diarrea, disnea, flatulencia, náusea, dolor de cabeza y mialgia.

**Dosis:** La dosis recomendada es 1 comprimido recubierto de Dissualon® ó Dissualon® Plus al día, dependiendo de los niveles de colesterol LDL.

## Presentaciones:

Dissualon®: Caja conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.  
Dissualon® Plus: Caja conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

**Almacenamiento:** Almacenar a temperatura menor de 30°C, protegido de la luz y humedad.

Producto medicinal manténgase fuera del alcance de los niños.



Producto elaborado por  
**Laboratorios Vizcaino, S. A.**

La experiencia de más de 70 años, garantía de calidad para prescribir  
Sistema de Farmacovigilancia: [farmacovigilancia@vizcainosa.com](mailto:farmacovigilancia@vizcainosa.com)  
Información para el consumidor: (502) 24940500

## **Consejos para bajar el colesterol y evitar riesgos graves de salud**



- Mantener una dieta variada, con abundancia de cereales, verduras y frutas.

- Reducir el sobrepeso con una dieta baja en calorías.




- Disminuir el consumo de carnes rojas, huevos (máximo 2 ó 3 por semana), leche entera y derivados (helados, mantequilla, yogures enteros, quesos grasosos).

- Consumir preferentemente aceite de oliva y evitar los aceites de coco y palma presentes en frituras y precocidos.



- Incluir frecuentemente en la dieta los pescados blancos y en especial, los azules (sardina, atún, salmón).

- Evitar el consumo de alcohol.



- No fumar.

- Hacer ejercicio físico de forma regular.



Referencia:

Recomendaciones para la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular.

Alteración Lipídica como factor de riesgo de la Sociedad Española de Arteriosclerosis - SEA en <http://www.searteriosclerosis.org/>