

# Flamantil®

## Naproxén Sódico

### Composición:

#### Suspensión

Cada 5 mL de suspensión reconstituida contienen:

Naproxén Sódico..... 125 mg  
Excipientes c.s.p. .... 5 mL

#### Comprimidos recubiertos de 550 mg

Cada comprimido recubierto contiene:

Naproxén Sódico .....550 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 comprimido

### Acción terapéutica:

Es un agente analgésico no narcótico con acentuada acción antiinflamatoria y antipirética.

### Indicaciones:

Para el alivio y tratamiento del dolor y la inflamación de origen traumático, odontológico, ginecológico, reumatológico o secundario a infecciones. En dismenorrea, migraña, gota aguda y en algunos desórdenes musculoesqueléticos como espondilitis anquilosante, osteoartritis y artritis reumatoidea (incluyendo la juvenil).

### Efectos secundarios:

Principalmente son:

Trastornos gastrointestinales como dispepsia, pirosis, náuseas, dolor abdominal, diarrea y flatulencia. Entre otros efectos están: confusión, insomnio, estomatitis, palpitaciones, taquicardia, rash cutáneo y ocasionalmente anemia. Puede alterar los análisis de la función hepática. Debido a la posibilidad de sensibilidad cruzada, **Flamantil®** está contraindicado en pacientes en quienes el ácido acetilsalicílico u otra droga antiinflamatoria no esteroidea induzca manifestaciones alérgicas.

### Contraindicaciones:

Como otros medicamentos de esta clase terapéutica, **Flamantil®** debe ser administrado con cuidado en pacientes con asma, broncoespasmos, desórdenes hemorrágicos, enfermedad cardiovascular, úlcera péptica, insuficiencia renal severa y en aquellos pacientes que están recibiendo anticoagulantes cumarínicos.

### Precauciones:

Debe tenerse precaución en embarazo y lactancia, así como en niños menores de un año.

### Interacciones:

No administrar conjuntamente con acetaminofén y otros AINES, sales de oro, alcohol, nifedipina, anticoagulantes, verapamilo y probenecid.

### Uso y administración: Oral.

Edad	Dosis	Frecuencia
Niños 2-4 años	11 mg/kg de peso	Dosis inicial
	2,75-5,50 mg/kg o	Cada 8 horas
	2,5 mL (1/2 cucharadita)	Cada 8 horas
5-8 años	5,0 mL (1 cucharadita)	Cada 8 horas
9-12 años	7,5 mL (1 1/2 cucharadita)	Cada 8 horas
Adultos	550 mg (1 comprimido)	Cada 12 horas
	275 mg	Cada 8-12 horas
Adulto Mayor	275 mg	Cada 12 horas
	137,5 mg	Cada 8-12 horas

### Presentación:

#### Suspensión pediátrica:

Frasco de 50 mL con 18 gramos de polvo para reconstituir.

#### Comprimidos recubiertos:

Caja con 60 comprimidos recubiertos.

Caja con 120 comprimidos recubiertos.



Producto elaborado por  
**Laboratorios Vizcaino, S. A.**

La experiencia de más de 70 años, garantía de calidad para prescribir  
Sistema de Farmacovigilancia: farmacovigilancia@vizcainosa.com  
Información para el consumidor: (502) 24940500