

Isocraneol®

Citicolina

Isocraneol® es un neuroprotector que regenera y mejora la función cognitiva. Además, protege al cerebro del daño producido por accidentes cerebrovasculares.

Isocraneol® estimula la biosíntesis de los fosfolípidos estructurales de la membrana celular.

Composición:

Isocraneol® 200 mg Comprimidos Recubiertos:

Cada comprimido contiene:

Citicolina..... 200 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

Isocraneol® 500 mg Comprimidos Recubiertos:

Cada comprimido contiene:

Citicolina..... 500 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

Isocraneol® 500 mg/2.5 mL Solución Inyectable:

Cada ampolla de 2.5 mL contiene:

Citicolina.....500 mg
Vehículo c.s.p..... 2.5 mL

Isocraneol® 1000 mg/5mL Solución Inyectable:

Cada ampolla de 5 mL contiene:

Citicolina.....1000 mg
Vehículo c.s.p..... 5 mL

Isocraneol® 100 mg/mL Solución Oral Gotas:

Cada mL de solución oral contiene:

Citicolina.....100 mg
Vehículo c.s.p.....1 mL

Vía de administración:

Isocraneol® Comprimidos: Oral.

Isocraneol® Solución Inyectable: Puede administrarse por vía intramuscular, vía intravenosa lenta (3 a 5 minutos, dependiendo de la dosis) o en perfusión intravenosa por goteo.

Indicaciones:

Isocraneol® está indicado para el tratamiento de trastornos neurológicos y/o cognitivos asociados a accidentes cerebrovasculares agudos y subagudos, traumatismos craneales recientes e insuficiencia cerebral.

Dosificación:

Isocraneol® debe administrarse según indicación médica y de acuerdo a las necesidades individuales de cada paciente.

La dosis recomendada es:

Adultos: 500 a 2000 mg por día de acuerdo a la severidad de los trastornos neurológicos que presente el paciente.

No se requiere un ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada.

No se prevén problemas con la administración de **Isocraneol®** en pacientes pediátricos.

Contraindicaciones:

Isocraneol® se encuentra contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al principio activo (citicolina) o alguno de sus excipientes.

El uso de **Isocraneol®** está contraindicado en pacientes con hipertensión del sistema nervioso parasimpático y que presenten crisis convulsivas.

Precauciones:

Isocraneol® Solución Inyectable debe administrarse inmediatamente después de la apertura de la ampolla. Los restos no utilizados deben desecharse.

En caso de hemorragia intracraneal, no se recomienda administrar más de 500 mg por día.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda la administración de citicolina en mujeres embarazadas ni durante el período de lactancia.

Reacciones adversas:

Isocraneol® es generalmente bien tolerado a las dosis recomendadas. Raramente se presenta insomnio, vértigo, convulsiones, náuseas y dolor de cabeza.

Ocasionalmente, **Isocraneol®** puede producir una acción estimulante del sistema nervioso parasimpático.

Presentaciones:

Isocraneol® 200 mg Comprimidos Recubiertos:
Caja conteniendo 30 comprimidos.

Isocraneol® 500 mg Comprimidos Recubiertos:
Caja conteniendo 10 comprimidos.

Isocraneol® 500 mg/2.5 mL Solución Inyectable:
Caja conteniendo 5 ampollas de 2.5 mL.

Isocraneol® 1000 mg/5 mL Solución Inyectable:
Caja conteniendo 5 ampollas de 5 mL.

Isocraneol® 100 mg/mL Solución Oral Gotas:
Caja conteniendo un frasco de 30 mL con gotero.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a una temperatura menor de 30°C, protegido de la luz y humedad.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción médica.



Producto elaborado por:
Laboratorios Vizcaino, S.A.

La experiencia de más de 70 años, garantía de calidad para prescribir
Sistema de Farmacovigilancia: farmacovigilancia@vizcainosa.com
Información para el consumidor: (502) 24940500