

Motrax[®]

Polietilenglicol 3350

Polvo para solución oral

Motrax[®] es un laxante osmótico cuya acción es retener agua en las heces para proporcionarles una consistencia suave e incrementar los movimientos en el intestino.

Composición:

Cada frasco de 150 g contiene:

Polietilenglicol 3350.....150 g

Cada frasco de 300 g contiene:

Polietilenglicol 3350.....300 g

Cada sobre de 17 g contiene:

Polietilenglicol 335017 g

Cada sobre de 10 g contiene:

Polietilenglicol 335010 g

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones:

Motrax[®] se encuentra indicado para el tratamiento del estreñimiento ocasional o crónico, según los criterios de Roma III para la constipación funcional:

- Menos de tres evacuaciones en siete días con ingesta normal de alimentos.
- Esfuerzo en defecación en más del 25% de las evacuaciones.
- Presencia de heces duras o terrones en más del 25% de las evacuaciones.
- Sensación de evacuación incompleta.
- Sensación de obstrucción ano-rectal.
- Necesidad de procedimientos manuales con el fin de facilitar las evacuaciones.

Dosificación:

Motrax[®] debe administrarse según indicación médica.

La dosis recomendada es:

Adultos: 17 g al día durante 7 a 14 días.

Niños de 3 Años de Edad en Adelante: 10 g al día durante 7 a 14 días.

La duración del tratamiento puede extenderse, según criterio médico.

Contraindicaciones

Motrax[®] está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al principio activo (Polietilenglicol 3350) o alguna de las siguientes

afecciones: Obstrucción o bloqueo intestinal (con dolor abdominal, náuseas, vómitos, estenosis, ulceraciones o adherencias), perforación de intestino, colitis, enfermedad intestinal severa, síndromes abdominales dolorosos de causa indeterminada o riesgo de perforación digestiva.

Precauciones:

En casos de constipación, el paciente debe ser evaluado por su médico para detectar condiciones metabólicas asociadas a la administración de otros medicamentos antes de administrar Polietilenglicol 3350.

El tratamiento con Polietilenglicol 3350 es una medida adyuvante a un tratamiento higiénico-dietético (por ejemplo, aumento de fibras en la dieta del paciente y ejercicio).

La administración de Polietilenglicol 3350 en pacientes con desórdenes alimenticios debe ser bajo prescripción médica.

Embarazo y lactancia:

La administración de **Motrax[®]** durante el embarazo y período de lactancia queda a discreción del médico tratante.

Reacciones adversas:

Las reacciones adversas más comunes son distensión abdominal, dolor, inflamación intestinal, calambres abdominales y náuseas. Ocasionalmente puede presentarse diarrea.

Presentaciones:

Motrax[®] Polvo para solución oral.

Caja con un frasco conteniendo 150 g de polvo para solución oral.

Caja con un frasco conteniendo 300 g de polvo para solución oral.

Caja conteniendo 15 sobres de 17 g de polvo para solución oral.

Caja conteniendo 20 sobres de 17 g de polvo para solución oral.

Caja conteniendo 15 sobres de 10 g de polvo para solución oral.

Caja conteniendo 20 sobres de 10 g de polvo para solución oral.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a una temperatura menor de 30°C, protegido de la luz y la humedad.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción médica.



Producto elaborado por:

Laboratorios Vizcaino, S.A.


Instrucciones para preparación y uso de Motrax®

Se recomienda seguir exactamente las instrucciones de administración y dosificación indicada por su médico.


Para su administración, **Motrax®** presentación en frasco se acompaña de una copa dosificadora con dos escalas: 10 gramos y 17 gramos. **Motrax®** sobres, viene en dos presentaciones 10 gramos y 17 gramos.

Administrar la dosis recetada por su médico.


Pasos para la preparación de **Motrax®**:



Si la presentación es en frasco verter **Motrax®** en la copa dosificadora hasta llegar a la línea que indica la dosis recetada.



Verter el polvo de la copa dosificadora o el contenido de un sobre según dosis indicada en 250 mL de agua pura, jugo natural, café, té o leche.



Revolver durante 1 minuto con una cuchara hasta que todo el polvo esté completamente disuelto.



Para asegurar la eficacia de **Motrax®**, tomar todo el contenido del vaso en una sola toma, preferiblemente por las mañanas.

El efecto inicial de **Motrax®** se produce aproximadamente entre 24 y 48 horas después de su administración. No aumente la dosis, ni la frecuencia sin antes consultar a su médico.