

# Mucarbol®

## Carbocisteína

Composición:	Jarabe Adultos	Jarabe Pediátrico	Gotas Pediátricas
Carbocisteína	750 mg	100 mg	50 mg
Excipientes c.s.p.	15 mL	5 mL	1 mL

### Propiedades:

Tratamiento de apoyo en casos de enfermedades agudas y crónicas de las vías respiratorias que se acompañan de perturbaciones graves de las secreciones locales por trastornos en la formación y transporte del mucus.

El mucus tiene una acción protectora de la mucosa y normalmente es limpio y fluido. Cuando se vuelve viscoso, adherente y espeso provoca la inmovilización de las secreciones y de la motilidad ciliar lo cual es factor de sobreinfección.

**Mucarbol®** disminuye la viscosidad patológica del mucus, lo licúa y permite su evacuación. Permite la regeneración de las mucosas afectadas, lo cual ayuda a la recuperación.

### Indicaciones:

**Mucarbol®** se usa en el tratamiento de desórdenes del tracto respiratorio asociados con mucus excesivo.

### Contraindicaciones y Precauciones:

Embarazo y Lactancia.

### Reacciones secundarias:

A las dosis recomendadas, no se han presentado. A dosis elevadas pueden presentarse fenómenos digestivos:

gastralgias, náuseas, diarrea.  
En estos casos, disminuir la dosis.

### Vía de administración:

 Oral.

### Posología Mucarbol® adultos:

1 cucharada antes de cada comida (15 mL)  
3 veces al día.

### Posología Mucarbol® pediátrico:

Infantes hasta 2 años

1/2 cucharadita antes de cada comida, 2 veces al día.

Niños de 2 a 5 años

1/2 a 1 cucharadita antes de cada comida, 3 veces al día.

Niños de 5 a 12 años

1 ó 2 cucharaditas antes de cada comida, 3 veces al día.

Esta posología puede aumentarse según criterio médico.

### Posología Mucarbol® gotas:

De 1 mes a 2 años de 20 a 30 mg/kg de peso/día, sin exceder 100 mg por dosis.

### Presentaciones:

Jarabe Adultos: frasco conteniendo 120 mL.

Jarabe Pediátrico: frasco conteniendo 120 mL.

Gotas Pediátricas: frasco conteniendo 30 mL.