

Norpax®

Clordiazepóxido + Amitriptilina / Uso oral

Composición:

Cada comprimido contiene:

Clordiazepóxido.....5.0 mg

Amitriptilina.....12.5 mg

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

Indicaciones:

Norpax® está indicado para el tratamiento de pacientes con depresión moderada a severa asociada con ansiedad moderada a severa. Los síntomas responden en la primera semana de tratamiento incluyendo insomnio, sentimientos de culpabilidad, agitación, ansiedad psíquica o somática, ideas suicidas y anorexia.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula y a otras benzodiazepinas o antidepresivos tricíclicos. No administrar conjuntamente con inhibidores de la MAO (Monoamino oxidasa). Si éstos ya se administraron debe dejarse como mínimo 14 días para iniciar el tratamiento con clordiazepóxido + amitriptilina. Está contraindicado durante la recuperación posterior a un infarto al miocardio, en el glaucoma, embarazo, lactancia y pacientes con retención urinaria.

Precauciones:

Usar con precaución en pacientes con historia de convulsiones. Se debe supervisar a pacientes con hipertiroidismo o que están con medicación de tiroides y pacientes con enfermedad de la función renal o hepática. Pacientes con tratamiento prolongado de Norpax® deben hacerse examen periódico del hígado y conteo de sangre.

Pacientes con ideas suicidas no deben tener acceso a grandes cantidades de Norpax®.

No administrar a niños menores de 12 años.

Interacciones:

Guanetidina o compuestos con similar mecanismo de acción, como la cimetidina.

Efectos adversos:

Sueño, sequedad de la boca, constipación, visión borrosa, mareo e inflamación. Con menos frecuencia: Impotencia, temblor, congestión nasal. Por sobredosis podemos observar: Arritmias cardiacas, hipotensión severa, convulsiones y depresión del sistema nervioso central, incluyendo coma. Algunos síntomas comunes del estado de depresión como anorexia, fatiga, debilidad y letargia han sido reportados. También se ha reportado, que un pequeño número de personas pueden experimentar mayor depresión o pensamientos suicidas, por lo que debe reportarlo inmediatamente a su médico.

Vía de administración: Oral.

Dosis:

Se recomienda una dosis inicial de 3 a 4 comprimidos diarios, dividida en varias dosis, ésta puede ser incrementada a 6 comprimidos diarios si fuera necesario. Para mantenimiento pueden darse 2 comprimidos diarios.

Presentación:

Caja con 30 comprimidos.

Caja con 90 comprimidos.



Producto elaborado por:
Laboratorios Vizcaino, S.A.