

Oraxima® Spray Bucal

Antiinflamatorio

Analgésico

Antiséptico Bucofaríngeo

Solución para pulverización bucal /

Vía de administración local oral.

Composición:

Cada mL contiene:

Extracto alcohólico de Propóleo (*propolis*)
a 35% (mezcla de resinas)

equivalente a 87.5 mg..... 0.25 mL

Extracto alcohólico de manzanilla
(*Matricaria recutita L.*) al 36% (parte usada:
Flores) equivalente a 180 mg..... 0.5 mL

Aceite esencial de Menta piperita:
(*Mentha piperita*)..... 6.5 mL

Aceite esencial de Eucalipto:
(*Eucalyptus*)..... 6.5 mL

Aceite esencial de Anís: (*Illicium
verum*)..... 1.8 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

Contiene alcohol 55%

Descripción:

Oraxima® está formulado con extractos y aceites esenciales naturales los cuales tienen propiedades terapéuticas altamente conocidas para el sistema respiratorio. El extracto de propóleo es una mezcla de resinas que obtienen las abejas de los árboles, dentro de sus principales propiedades están: Antiséptica, inmunoestimulante, antiherpética.

El extracto de manzanilla posee propiedades analgésicas y cicatrizantes. El aceite esencial de menta piperita brinda una sensación de frescura y además tiene propiedades antisépticas y expectorantes. El aceite esencial de eucalipto posee propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. El aceite esencial de anís además de ser antiséptico estimula el sistema inmunológico.

Indicaciones:

Oraxima® es usado para el tratamiento de enfermedades inflamatorias en el área bucal y faríngea. Molestias en las mucosas debido a enfermedades catarrales, laringitis, amigdalitis; es un antiséptico

bucal, efectivo contra aftas y llagas en la región bucal.

Recomendaciones al paciente:

Evite ingerir bebidas alcohólicas o fumar durante la terapia.

Precauciones:

Embarazo y lactancia: No se ha encontrado riesgo en el embarazo o lactancia sin embargo se debe consultar al médico antes de aplicarse este producto.

Advertencias:

No debe ser administrado en ojos o nariz. El producto puede presentar turbidez la cual desaparece rápidamente luego de agitar.

Efectos secundarios:

En raras ocasiones:

Sequedad en la boca, dispepsia, dolor de cabeza, náuseas, alergia, irritación en garganta (leve).

Contraindicaciones:

No utilizar si existe alergia (hipersensibilidad) a propóleo, manzanilla o alguno de sus compuestos activos.

No debe administrarse en recién nacidos, ni en niños menores de 2 años.

Dosis:

Dosis usual en adultos:



2 pulverizaciones cada 6 a 8 horas.
Durante 5 a 10 días.


Forma de aplicación:

Ver figuras.

Agítese antes de usar.

Antes de usar Oraxima, sustituya la tapa de rosca por el aplicador de spray adjunto. Mantener el frasco en posición vertical.





1. Girar el pulverizador hacia arriba, según indica el dibujo.
2. Mantener el frasco recto, poner el pulverizador dentro de la boca y dirigirlo hacia el fondo de la garganta. Presionar el pulverizador y aplicar la dosis adecuada en la zona afectada.
3. Después de su empleo, girar el pulverizador hacia abajo, según indica el dibujo.
4. Nota: Si deja de utilizar el pulverizador durante un largo tiempo, lávelo con agua caliente antes de utilizarlo nuevamente.

Uso apropiado:

No aplique más de la dosis prescrita. No lo utilice por más tiempo de lo recomendado por su doctor. El producto se puede utilizar después de abierto.

Presentaciones:

Caja conteniendo 1 frasco con 30 mL con pulverizador rotativo.

Condiciones de almacenamiento:

Producto farmacéutico natural, manténgase en lugar seguro, alejado del alcance de los niños.

Almacenar a una temperatura menor de 30°C, protegido de la luz y humedad. Producto Centroamericano, hecho en Guatemala por Laboratorios Vizcaíno, S.A.

Venta libre.



Producto elaborado por:
Laboratorios Vizcaíno, S.A.

La experiencia de más de 70 años, garantía de calidad para prescribir
Sistema de Farmacovigilancia: farmacovigilancia@vizcainosa.com
Información para el consumidor: (502) 24940500