

Redical®

Esomeprazol

Agente Antisecretores Gástrico

Redical® es un inhibidor de la bomba de protones selectivo que reduce la secreción de ácidos producidos en exceso en el estómago.

Composición:

Cada cápsula contiene:

Esomeprazol.....40 mg

Excipientes c.s.p.....1 cápsula

Cada sobre contiene:

Esomeprazol.....10 mg

Excipientes c.s.p.....1 sobre

Vía de administración:

Oral.

Indicaciones:

Redical® está indicado para el tratamiento de síntomas asociados a la enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE) y como tratamiento de diagnóstico confirmado de esofagitis erosiva. Se administra en combinación con un régimen terapéutico de antibióticos para el tratamiento a corto plazo de infecciones provocadas por *Helicobacter pylori* y úlcera duodenal.

Dosificación:

Redical® debe administrarse según indicación médica.

La dosis recomendada es:

Adultos y adolescentes mayores de 12 años:

Para el tratamiento de reflujo gastroesofágico (ERGE): 40 mg diarios durante 4 a 8 semanas.

Para el tratamiento de infecciones provocadas por Helicobacter pylori: Administrarse según indicación médica.

Niños de 1 a 11 años de edad:

Para el tratamiento de reflujo gastroesofágico (ERGE): Peso menor de 20 kg: 10 mg una vez al día durante 4 a 8 semanas.

Peso mayor de 20 kg: 10 mg o 20 mg una vez al día durante 4 a 8 semanas.

No se recomienda la administración de **Redical®** en niños menores de 1 año de edad.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada o pacientes que padecen insuficiencia renal o hepática leve o moderada. En pacientes con insuficiencia hepática severa, administrar una dosis máxima de 20 mg diarios.

Se recomienda su administración una hora antes del desayuno. Las cápsulas no deben ser masticadas.

Contraindicaciones:

Redical® está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad al principio activo (esomeprazol), a otros inhibidores de secreciones ácidas (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol) o algunos de sus excipientes.

Precauciones:

La administración de esomeprazol a largo plazo raramente puede ocasionar una gastritis atrófica en el paciente. Se debe administrar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática severa. Antes de administrar esomeprazol u otro inhibidor de secreciones ácidas a pacientes con úlceras gástricas, debe considerarse la existencia de un proceso maligno.

Embarazo y lactancia:

El uso de **Redical®** se encuentra contraindicado durante el embarazo y período de lactancia.

Reacciones adversas:

Las reacciones adversas más comunes son dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, flatulencia, dolor abdominal, constipación y sequedad bucal.

Interacciones con otros medicamentos:

Si el paciente se encuentra bajo tratamiento con fármacos metabolizados por la enzima CYP2C19 (ej. diazepam, citalopram, imipramina, clomipramina y fenitoína), se recomienda un ajuste de dosis para asegurar la eficacia terapéutica del esomeprazol. No se recomienda la coadministración de esomeprazol con atazanavir.

Presentaciones:

Redical® 40 mg Cápsulas:

Caja conteniendo 15 cápsulas.

Redical® 10 mg Polvo para suspensión oral:

Caja conteniendo 28 sobres.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a una temperatura menor de 30°C, protegido de la luz y la humedad.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción médica.

Producto elaborado por:



Laboratorios Vizcaino, S.A.

La experiencia de más de 70 años, garantía de calidad para prescribir


Sistema de Farmacovigilancia: farmacovigilancia@vizcainosa.com

Información para el consumidor: (502) 24940500

Instrucciones para preparación y uso de Redical® 10 mg

Se recomienda seguir exactamente las instrucciones de administración y dosificación indicadas por su médico.

Pasos para la preparación de **Redical® 10 mg**:



Verter el contenido de un sobre de **Redical® 10 mg** en 15 mL de agua pura.



Revolver y dejar reposar por 2 minutos.



Revolver nuevamente y beber el contenido completo de la mezcla. No dejar reposar la mezcla durante más de 30 minutos.

No aumentar la dosis, ni la frecuencia sin antes consultar a su médico.



VIZCAINO

LA EXPERIENCIA DE MÁS DE 70 AÑOS, GARANTÍA DE CALIDAD PARA PRESCRIBIR