



Velicox® M

Analgésico, antiinflamatorio no esteroideo

Composición:

Cada comprimido contiene:

Meloxicam..... 15.0 mg
Excipientes c.s.p. 1 comprimido

Cada ampolla contiene:

Meloxicam..... 15.0 mg
Vehículo c.s.p. 1.5 mL

Indicaciones:

En procesos que requieren acción antiinflamatoria, analgésica o ambas como la osteoartritis, artritis reumatoidea y espondilitis anquilosante.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al Meloxicam o cualquier otro ingrediente de la fórmula.

En pacientes con úlcera péptica activa o insuficiencia hepática o renal severa; historia de urticaria, angioedema, broncoespasmo, rinitis severa, pólipos nasales o shock provocado por la administración de aspirina u otro antiinflamatorio no esteroideo. No administrar en menores de 12 años, ni durante el embarazo y lactancia.

Precauciones:

Debe ser usado con precaución en ancianos, debe evaluarse la función hepática y renal si se utiliza por períodos prolongados.

A nivel gastrointestinal existe riesgo de ulceración, sangrado y perforación, si se presentara debe suspenderse el medicamento.

Puede presentarse alguna reacción alérgica.

Interacciones:

Inhibidores de la ECA, aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, furosemida, litio, warfarina.

Reacciones adversas:

Reacción anafiláctica, anemia, sangrado gastrointestinal o hemorragia, diarrea dispepsia, flatulencia, dolor de cabeza, prurito, mareo, edema, infección del tracto respiratorio superior, con menor frecuencia dolor abdominal, ansiedad, confusión, constipación, náusea, vómito, neviosismo y somnolencia.

Administración:

Los comprimidos por vía oral.

La solución inyectable por vía intramuscular profunda.

Dosis:

Osteoartritis: 7.5 mg diarios en una sola dosis, la dosis puede ser incrementada a un máximo de 15 mg diarios en una sola dosis. Artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante: 15 mg diarios en una sola dosis, puede dejarse en 7.5 mg diarios en una sola dosis. Vía intramuscular profunda: Una ampolla una vez al día, esta vía debe utilizarse únicamente en los primeros días, luego debe continuarse por vía oral.

Presentación:

Caja conteniendo 20 y 100 comprimidos de 15.0 mg

Caja conteniendo 1 y 5 ampollas con solución inyectable de 15 mg/ 1.5 mL



Producto elaborado por:
Laboratorios Vizcaíno, S.A.

La experiencia de más de 75 años, garantía de calidad para prescribir
Sistema de Farmacovigilancia: farmacovigilancia@vizcainosa.com
Información para el consumidor: (502) 24940500